



1, 2. 長腹角蜻蛉 (1, 雄; 2, 雌) *Acheron trux* Walker. 角  
蜻蛉科


體呈暗褐色，頭部密生長毛。觸角甚長，末端成圓形。雄者  
腹部甚長，翅透明；雌者腹部較短，翅較闊，黃褐色。分布於我  
國、臺灣、印度等處。本科昆蟲屬於脈翅目，非如以前各蜻蛉科  
昆蟲之屬於蜻蛉目者。

—昆蟲圖譜上冊—



2

—昆蟲譜上冊—



1. 角蜻蛉 *Hybris subjacens* Walker. 角蜻蛉科

背面黃褐色，側面黑褐色。翅透明，緣紋黑褐色。八月間出現。分布於我國、日本等處。

2. 小蚊蜻蛉 *Myrmeleon formicarius* Linné. 蛇蜻蛉科

體灰褐色，密生淡黃色短毛。翅透明，緣紋黃色。分布於我國、西伯利亞、日本、臺灣等處。

3. 斑紋蛇蜻蛉 *Neochauliodes sinensis* Walker. 蛇蜻蛉科

體暗紅色，觸角呈羽狀。翅有赭褐色斑。前緣形成蛇腹狀。分布於我國及臺灣。

4. 黑龍江舉尾蟲 *Panorpa amurensis* MacLachlan. 舉尾

蟲科

體形頗小，暗紅色。翅淡黃色，有黑褐色斑紋。分布於我國黑龍江及朝鮮。

1. 紫石蠶 *Eubasilissa regina* MacLachlan. 石蠶科

體黑褐色，前翅黃色，有黑褐色斑紋；後翅紫黑色，翅尖附近處有黃色闊帶。八月間出現。分布於我國、日本、印度等處。

2. 長鬚石蠶 *Stenopsyche griseipennis* MacLachlan. 石蠶科

體形較前種小，黃褐色。觸角細長。前翅灰白色，半透明，有褐色斑紋；後翅白色。產於流水附近，見燈光即飛來。我國、日本、印度均有分布。

3. 水牛蠶 *Haematopinus tuberculatus* Burmeister. 獸蠶科

體暗灰色，有黑褐斑。寄生於水牛、豬、駱駝、野牛等體上。產於我國南部、臺灣、印度、蘇門答臘、羅馬尼亞、非洲等處。

4. 猿蠶 *Pedicinus eurygaster* Gervais. 猿蠶科

體形較水牛蠶小，寄生於猿類體上。世界各地均有分布。

5. 毛蠶 *Phthirus pubis* Linné. 毛蠶科

體略呈圓形，灰白或灰黃色。爪強大。寄生於毛髮上，吸食血液。驅除法：塗布水銀軟膏、昇汞醋酸於寄生處。世界各地均有分布。


6. 頭蠶 *Pediculus capitis* Deg. 蠶科

體呈暗灰色，寄生於頭髮間，吸食血液。驅除法：塗布橄欖油及石油。世界各地，均有分布。

—昆蟲圖譜上冊—



1



2



3



4



5



6

—昆蟲圖譜上冊—



1




2



3



4



5



6

1. 角蠟蟲 (雌) *Ceroplastes ceriferus* Anderson. 介殼蟲科

全體被蠟質物，白色。圓形。周邊有角狀突起。寄生於柑、橘、蘋果、梨、柿、桃、櫻、梔子、竹、柏、杏、柳、椿、山茶、茶、桑等樹上。世界各地均有分布。

2, 3. 紐綿介殼蟲 (雌) *Takahashia japonica* Cockerell. 介

殼蟲科

體灰黃色，卵形。外被頗長之綿狀卵囊。寄生於桑、荻、合歡、柳、棲、櫟等樹上。分布於我國及日本（圖3為卵囊完成後之形狀）。

4. 梨圓介殼蟲 *Aspidiotus perniciosus* Comstock. 介殼

蟲科

體扁平，黃色。外被圓形灰白色之殼。雄者介殼呈長橢圓形，黃褐或黑褐色。為梨及其他果樹之大害蟲。分布殆徧世界。

5, 6. 吹綿介殼蟲 (5, 雄; 6, 雌卵囊) *Icerya purchasi*

Mask. 介殼蟲科

雌者橢圓形，腹面扁平，背面隆起似龜甲。全體暗橙赤色。成熟後，被白色綿狀蠟質物之卵囊。原產地在大洋洲，現已徧布世界，為柑、橘、梨、柿、茶、桑、大豆等之害蟲。最有效之防除法，為飼養能捕食本種之天敵黑腹紅瓢蟲 (*Rodolia* sp.)。

1, 2. 五倍子蟲 (1, 雌; 2, 蟲癟) *Schlechtendalia mimifushi*

Matsumura. 綿蟲科

雄者體黃褐色，翅透明。雌者棲於鹽膚木，以產卵管刺入枝葉而產卵。初生之幼蟲多寄生於枝葉傷處，作成紫褐色果實形之蟲癟，即謂之五倍子，爲鞣酸之原料。分布於我國及日本等處。

3. 蝗蟲 *Rhopalosiphum persicae*. 蝗蟲科

體暗赤色。翅透明，蜜管及腳灰黃色。爲豆科、茄科、葫蘆科、十字花科、薔薇花科、芸香科等植物之害蟲，繁殖營世代交替，與蟻共棲。

4, 5. 烏帽子羽衣 *Tonga fusiformis* Walker. 圓浮塵子科

體綠色。頭長而尖，向上方突出。翅鞘頗大，靜止時與底面殆相垂直。分布於我國南部、臺灣、印度（圖4爲靜止狀）。


6. 青翅羽衣 *Geisha distinctissima* Walker. 青翅羽衣科

體綠色。爲梅、桃、橘等果樹之害蟲。我國、朝鮮、臺灣均有分布。

7. 星星羽衣 *Cryptoflata guttularis* Walker. 青羽翅衣科


體淡綠色，有黑色小斑點，後翅乳白色。分布於我國、臺灣、爪哇、阿薩姆等處。

—昆蟲圖譜上冊—




6


—昆蟲圖譜上冊—




1



2



3



4



6

—昆蟲圖譜上冊—

1. 黑翅羽衣 *Ricania proxima* Melichar. 鰷甲羽衣科

體黑色。前翅黑色，後翅灰褐色，半透明。分布於我國南部及南洋羣島等處。

2. 透翅羽衣 *Euricania ocellus* Walker. 鰷甲羽衣科

體黑褐色。翅白色，有褐色環紋。產於我國、印度、琉球。

3. 白紋羽衣 *Ricania Speculum* Walker. 鰷甲羽衣科

體形較大，全體黑褐色，前翅有白斑。產於我國南部、印度及臺灣。

4. 白星羽衣 *Ricania marginalis* Walker. 鰷甲羽衣科

體色與上種相似。產於我國南部、印度、臺灣等處。

5. 象蠟蟲 *Dictyophala patruelis* Stål. 象蠟蟲科

體淡綠色。翅透明。爲禾本科植物之害蟲。分布於我國及日本。

6. 禾蠟蟲 *Udagama splendens* Germar. 象蠟蟲科

體暗褐色。翅透明，末端及緣紋黑褐色。分布於我國、日本、印度。

1. 細綠白蠟蟲 *Saccharosydne procerus* Matsumura. 白蠟蟲科

體綠色。翅細長，前端尖銳，亦呈綠色。爲稻之害蟲。分布於我國、日本、朝鮮等處。

2. 薑色扇形白蠟蟲 *Ommatissus binotatus* Fieber. 扇形白蠟蟲科

體黃褐色。分布於我國、日本、印度、歐洲、非洲。

3. 綠色扇形白蠟蟲 *Tambinia debilis* Stål. 扇形白蠟蟲科

體淡綠色。分布於我國南部、印度、臺灣。

4. 長扇形白蠟蟲 *Ossoides lineatus* Bierman. 扇形白蠟蟲科

體淡黃綠色。分布於我國南部、日本、臺灣、爪哇。

5. 條紋菱形白蠟蟲 *Oliarus quadricinctus* Matsumura. 菱形白蠟蟲科

體黑色。翅半透明，有黑色斑紋。分布於我國及日本。

6. 縞白蠟蟲 *Nisia atrovenosa* Lethierry. 縞白蠟蟲科  
體黃褐色，多白粉。爲禾本科植物之害蟲。分布於我國及日本。


—昆蟲圖譜上冊—




1



2




3



4



5



6

—昆蟲圖譜上冊—




1



4




7



2




5




8



3



6



9

1. 二點浮塵子 *Cicadula fascifrons* Stål. 浮塵子科  
體黃綠色，頭頂有黑點2。爲禾本科植物之大害蟲。分布於我國、日本及歐美各國。
2. 菱紋浮塵子 *Eutettix disciguttus* Walker. 浮塵子科  
體淡褐黃綠色。棲息於桑樹及其他各種灌木上。我國、日本、印度、南洋羣島等處均有分布。
3. 白星浮塵子 *Scaphoideus festivus* Matsumura. 浮塵子科  
體黃褐色，甚美。有淡黃色及灰色斑點。分布於我國、日本、臺灣、錫蘭。
- 4, 5. 前白大浮塵子 (4, 雌; 5, 雄) *Ishidaella albomarginata* Signoret. 大浮塵子科  
體淡黃綠色。爲薔薇等害蟲。分布於我國、印度等處。
6. 大浮塵子 *Cicadella viridis* Linné. 大浮塵子科  
體綠色。爲稻、麥、桑、楮等害蟲。分布於我國、日本、印度、歐洲、非洲。
7. 網目浮塵子 *Jassus praesul* Horváth. 大浮塵子科  
體黃褐色。棲於櫟榆等樹上。我國、日本均有分布。
8. 黑邊大浮塵子 *Cicadella ferruginea* Fabricius VAR.  
*apicalis* Walker. 大浮塵子科  
體黃綠色。翅緣有黑邊，其他部分有黑斑。爲茶、桑等害蟲。分布於我國、日本、印度、臺灣。
9. 緣姬浮塵子 *Chlorita flavesens* Fabricius. 姬浮塵子科  
體淡綠色。爲果樹、蔬菜等害蟲。分布於我國及歐美。

1. 黑條細匙浮塵子 *Nirvana Orientalis* Matsumura. 匙浮塵子科

體扁平，淡黃色。體之正中線上有黑線及不規則黑點。分布於我國北部、日本及臺灣。

2, 3, 4. 圓吹泡蟲 *Lepyronia coleoptrata* Linné. 吹泡蟲科  
雄者全體略成圓形，黃褐或黑褐色，密生灰白色短毛。雌者呈長卵形，灰黃色，被銀白色短毛。分布於我國、日本、歐洲、中亞、北非等處。圖3爲前翅較短之1種，圖4爲雜種 (var. *grossa*)。

5, 6. 矮吹泡蟲 *Ptyelus pallidus* Melichar. 吹泡蟲科  
體形較小，黃褐色，分布於我國、臺灣、印度等處。圖6爲產於東三省者。

7. 黑斑吹泡蟲 *Sinophora maculosa* Melichar. 吹泡蟲科  
體黃色，有褐色斑紋，寄生於松樹上。我國北部及日本均有分布。

8, 9. 臺灣天狗吹泡蟲 (8, 雌; 9, 雄) *Philagra numerosa* Lallemand. 吹泡蟲科

體呈紡錘形，銹褐色。產於我國南部、印度、臺灣等處。


10. 紅色小頭吹泡蟲 *Cosmoscarta bispecularis* Walker. 小頭吹泡蟲科

體深紅色，有光澤，且有黑色斑點。產於我國南部、印度、臺灣等處。

—昆蟲圖譜上冊—



1



5



2



6



7



3



8



9




4




10

—昆蟲圖譜上冊—




1




5




2




6




3



7



4



8

1. 黃蚧 *Aphana pulchella* Guérin. 琵琶蟬科

體暗褐色，腹部紅色。前翅褐色，密生黑色斑點，後翅橙色，有白色及黑色斑點，末端黑色。分布於我國南部、臺灣、爪哇等處。

2. 斑蚧 *Lycorma delicatula* White. 琵琶蟬科

體黑褐色，前翅灰色，翅端褐色，其他部分有黑斑。後翅之 $\frac{1}{2}$ 褐色，有白斑，其餘 $\frac{1}{2}$ 紅色。分布於我國南部、日本、琉球。

3, 4. 耳蟬 (3, 雄; 4, 雌) *Ledra auditura* Walker. 耳蟬科  
體呈黃褐色。前胸 2 側有耳狀突起，前翅半透明。分布於我國、日本、朝鮮等處。

5, 6. 臺灣小角蟬 (5, 雄; 6, 雌) *Tricentrus basalis* Walker. 角蟬科

體形頗小，黑色。前胸背有角狀突起。前翅淡黃色，後翅透明。分布於我國、新加坡、爪哇、臺灣等處。

7. 榆角蟬 (雌) *Machaerotypus sibiricus* Lethierry. 角蟬科

體暗褐色。分布於我國北部、西伯利亞及日本。

8. 高脊角蟬 (雌) *Pantaleon dorsalis* Matsumura. 角蟬科  
體形與榆角蟬相似，脊部隆起較顯著，體色赭褐。產於我國及臺灣。

1, 2. 朝鮮蟬 (1, 雄; 2, 雌) *Oncotympana coreana* Kato.

蟬科

體黑褐色，腹部前端黃褐色。翅透明，翅脈黑褐色。鳴聲爲  
口丨𠂇 口丨𠂇。分布於我國及朝鮮。

3. 蟬 (雄) *Oncotympana maculaticollis* Motschulsky.

蟬科

體形較上種略大，黑色，有綠色斑紋。鳴聲與上種相同。分  
布於日本，我國北部亦有發見。


4. 臺灣蜩 (雄) *Pomponia fusca* Olivier. 蟬科

雄者腹部甚大。體色褐黃，略帶綠色。鳴聲甚美，爲：  
×𠂇 ×𠂇 ×𠂇 ..... T|Y T|Y T|Y T|Y T|Y  
万丶一 T|Y T|Y T|Y T|Y T|Y 万丶一！產於我國及南  
洋、臺灣。


5. 寒蟬 (雄) *Meimuna opalifera* Walker. 蟬科

體黑色，頭及胸有黃綠色斑紋。八月間出現，多棲於堤柳  
上。鳴聲爲 卍 × 卍 × 巳 — T | ..... 卍 × ヽ | 𠂇 —  
T |。故俗名‘知了。’幼蟲有以土塊築塔之習慣。分布於我國及  
日本。

—昆蟲圖譜上冊—



—昆蟲圖譜上冊—



1. 蚝蟬 (雄) *Cryptotympana japonensis* Kato. 蟬科

體黑色，有光澤。翅透明，翅脈在基部之 $\frac{1}{2}$ 綠色，其餘 $\frac{1}{2}$ 黑褐色。八月間出現，鳴聲頗高，作：丁！丫—丁！丫—聲。分布於我國及日本。本種之蟬蛻供藥用。

2. 朝鮮蟬 (雄) *Meimuna mongolica* Distant. 蟬科

體形短小，褐黃色，有綠斑。翅透明，翅脈黑褐色。產於我國及朝鮮。

3. 黑緣蟬 (雄) *Nipponosemia terminalis* Matsumura. 蟬科

體形較上種更小，黑色，有黃色及紅綠色斑。產於我國四川及日本。


4. 臺灣蚝蟬 (雄) *Cryptotympana holsti* Distant. 蟬科

體頗肥大，黑色，有光澤。翅大，前後翅基部之 $\frac{1}{2}$ 黑褐色。多棲於樹上，鳴聲如蚝蟬而較大。產於我國南部及臺灣。

5. 朝鮮蟋蟀 (雌) *Suishia coreana* Matsumura. 蟬科

體形短小，黑褐色，前翅基部之 $\frac{1}{2}$ 黃色，其餘 $\frac{1}{2}$ 淡色，均有黑斑。後翅黃色有黑斑。出現於秋深時，鳴聲爲〈—〉—〈—〉—。產於我國及朝鮮。

—昆蟲圖譜上冊—



—昆蟲圖譜上冊—

1. 茶翅蚱蟬 (雄) *Cryptotympana mandarina* Distant.

蟬科

體形似紅翅蚱蟬 (見上面), 黑褐色, 有光澤。翅茶色, 基部最濃。分布於我國南部及臺灣等處。

2. 邇羅蚱蟬 (雄) *Cryptotympana facialis* Walker. 蟬科  
體形與上種相仿, 呈褐青色。翅透明, 基部褐黃色。分布於我國、暹羅、臺灣。

—昆蟲圖譜上冊—

1. 水斧蟲 *Ranatra chinensis* Mayr. 紅娘華科

前肢鎌狀，尾端附屬器較體稍長。體呈暗黃褐色。棲息於池沼中。產於我國及日本。

2, 3. 水鼈 (2, 雄; 3, 雌) *Aquarius pallidum* Fabricius. 水鼈科

體形小，上部黑褐色，下部密生銀黃色細毛。常在池沼之水面跳走，捕食他蟲。分布於我國、日本等處。

4, 5. 水馬 (4, 雌; 5, 雄) *Aquarius elongatus* Uhler. 水鼈科

體黑褐色。中、後肢甚長，便於水上疾走。分布於我國、日本、臺灣。

6. 渲蚱 *Metrocoris histrio* B. White. 水鼈科

體略呈卵形，暗黃色，腹部黑色。有上溯流水之習性。產於我國及日本。


7. 小背紅水鼈 *Gerris gracilicornis* Horváth. 水鼈斜

體形酷似水鼈，惟肢較短，色較紅。分布於我國、日本、臺灣、印度。


8. 水蠣 *Hydrometra albolineata* Uhler. 河水鼈科

體黑褐色。習性略似水鼈。分布於我國及日本。

—昆蟲圖譜上冊—




—昆蟲圖譜上冊—



1




3




2



4



5



6

—昆蟲圖譜上冊—

1. 風船蟲 *Sigara distanti* Kirkaldy. 風船蟲科

體褐黃色。分布於我國東北、日本、朝鮮。

2, 3. 眼水蟲 *Ochterus flavomarginatus* Scott. 眼水蟲科

體呈短橢圓形，略扁，黑褐色。眼甚大，突出。棲息於水田、池沼等溼地，能活潑跳躍。分布於我國及日本。

4. 臺灣松藻蟲 *Enithares sinica* Stål. 松藻蟲科

體褐黃色。棲息池沼中。分布於我國南部、臺灣等處。

5, 6. 田鼈 *Kirkaldyia deyrollei* Vuillefrog. 田鼈科

體扁平，呈長橢圓形。灰褐色。前翅革質，後翅淡黃色。前肢腿節甚粗，跗節具強大之爪。棲息於水田、古池等處，捕食魚類，為害甚大。圖 6 為展翅時之姿態。分布於我國、日本、朝鮮、臺灣、阿薩姆。

—昆蟲圖譜上冊—

1. 腦蠶 *Uhlerites debilis* Uhler. 木蠶科

體黑褐色。頭小，突出。前胸背中央作鞍狀隆起。前翅淡黃，  
2翅相合呈X形暗色斑。棲於植物葉上。我國及日本均有分布。

2. 牀蟲（俗名臭蟲）*Cimex lectularius* Linné. 牀蟲科

體呈卵形，扁平，赤褐色。無翅。吸食人體血液。可撒布除蟲  
菊粉或薰蒸硝基三氯甲烷、氰化氫驅除之。世界各地均有分布。  
本種屬有吻目，與屬於蟲目及食毛目之蟲類又不同。

3. 僧蠶 *Deracocoris ater* Jakovlev. 盲椿象科

體黑色，有光澤。分布於我國、西伯利亞、日本。

4. 莖蠶 *Adelphocoris suturalis* Jakovlev. 盲椿象科

體淡綠色，有暗褐色斑。分布區域同上。

5. 粗腳刺椿象 *Prostemma hilgendorfii* Stein. 牧場刺椿

象科

體色黑，中央部及肢基部朱色。產於我國及日本。

6. 芥腳長刺椿象 *Mylophanes tipulina* Reuter. 刺椿象科

體細長，淡黃褐色，前腳爲捕獲腳，其餘4肢甚長。分布於  
我國及日本。

—昆蟲圖譜上冊—


1




2



3




5



4




5



6

—昆蟲圖譜上冊—



1. 針椿象 *Cletus rusticus* Stål. 有緣椿象科  
體褐黃色。肢色較黃。產於我國及日本。
2. 赤緣椿象 *Serinetha augur* Fabricius. 有緣椿象科  
體形較長，朱紅色，翅之膜質部黑色。產於我國南部、臺灣、印度等處。
3. 臺灣細緣椿象 *Riptortus linearis* Fabricius. 有緣椿象科  
體形較細，褐赭色。後肢發達，有棘。產於我國、臺灣、印度、琉球。
4. 紅豆緣椿象 *Acanthocoris concoloratus* Uhler. 有緣椿象科  
體形略似赤緣椿象，體色似上種而較黑，2側有斑點。爲豆類之害蟲。分布於我國及日本。
5. 闊腹緣椿象 *Homoeocerus unipunctatus* Thunberg.  
有緣椿象科  
腹闊。體色褐黃，密布黑色小點。產於我國北部及日本。
- 6, 7. 黃腹緣椿象 (6, 雄; 7, 雌) *Plinachtus bicoloripes* Scott. 有緣椿象科  
體色黑褐，翅之膜質部透明，淡褐色。圖 7 為雌者展翅時姿態。
8. 大蜘蛛緣椿象 *Anacanthocoris striicornis* Scott. 有緣椿象科  
體鮮綠色，略帶褐色。腹部膨出如蜘蛛。產於我國北部及日本。

1. 蝦色椿象 *Gonopsis affinis* Uhler. 椿象科

體黃褐色。分布於我國、日本、琉球。

2, 3. 鋸角椿象 (2, 雄; 3, 雌) *Acanthosoma labiduroides*

Jokovler. 椿象科

體鮮綠色，有黑色小點。雄者至生殖期有顯著之長鋸狀物突出於後方，呈朱紅色。產於我國黑龍江及日本。

4. 姬菜椿象 *Eurydema pulchra* Westwood. 椿象科

體黑色，有紅色緣紋。爲十字花科植物之害蟲。產於我國、日本、印度等處。


5. 一字形椿象 *Piezodorus rubrofasciatus* Fabricius. 椿象科

體形稍大，褐黃綠色，前胸背有一字形橫帶。產於我國、印度、非洲、澳洲。

6, 7. 臺灣大椿象 *Eurostus validus* Dallas. 椿象科

體栗褐色，有光澤。觸角之第一節橙黃色。雌雄均能發音。產於我國及臺灣。圖 6 為本種之幼蟲，扁平，朱赤色，甚美麗。


—昆蟲圖譜上冊—



—昆蟲圖譜上冊—



1




2




3



4



5



6



7



8

1. 青臭椿象 *Nezara antennata* Scott. 椿象科

體綠色。爲禾本科植物之害蟲。產於我國、日本、歐洲。

2, 3 青椿象 *Nezara viridula* Linné. 椿象科

酷似上種，惟前胸背無灰白帶。亦爲禾本科植物之害蟲。分佈於我國、日本、歐洲。圖 3 為基本型，體色黃，有綠色斑點。

4. 十星椿象 *Lelia decempunctata* Motschulsky. 椿象科

體暗黃色，有黑點 10 個。寄生於榆樹上。產於我國及日本。

5. 黃黑緣椿象 *Aspongopus chinensis* Dallas. 椿象科

體黑褐色，有銅色光澤。全體肥大，然口吻甚細。爲瓜類及其他植物之害蟲。分布於我國、暹羅、臺灣。

6. 赤椿象 *Menida histrio* Fabricius. 椿象科

體暗朱色，有光澤。爲稻之害蟲。產於我國、印度、臺灣。

7. 白緣椿象 *Menida violacea* Motschulsky. 椿象科

體形較上種稍大，黑色，有紫色光澤；前胸背側緣及前緣淡黃色，又前胸背左右肩之連接部分有不分明白帶。產於我國、日本、西伯利亞。

8. 鋸刺椿象 *Megymenum gracilicorne* Dallas. 椿象科

體黑褐色，全體棘刺狀突起。分布於我國、日本、臺灣。

1. 激躑 *Anadastus filiformis* Fabricius. 擬叩頭蟲科

體呈圓柱狀。赤褐色，有光澤。頗似叩頭蟲。產於我國、日本。  
本。

2. 紅螢 *Lycostomus modestus* Kiesenwetter. 螢科

體黑褐色，翅鞘暗紅色。恆集於花間。產於我國及日本。

3. 螢 *Luciola vitticollis* Kies. 螢科

體黑褐色，前胸背及尾端 2 節暗黃色或淡紅色，前胸背中央且有暗褐色十字紋。棲於清流附近。產於我國及日本。

4. 紅螢 *Lycos omus devidis* Fairmair. 螢科

前胸背及翅鞘褐黃色，觸角及肢腳黑褐色。產於我國。臺灣。

5. 摳葉蟲 *Lagria nigricollis* Hope. 摺葉蟲科

體黑色，翅鞘黃褐色或赤褐色。食害豆科植物。產於我國、日本、西伯利亞。

6. 大青叩頭蟲 *Campsosternus auratus* Drury. 叩頭蟲科

體頗長，前胸背及翅鞘褐青色，有光澤。產於我國，臺灣，印度。

7. 圓頭叩頭蟲 *Hemipterus flava* Casternau. 叩頭蟲科

體形較小，醬黑色，有光澤。本種與上種不同，前胸不能運動。產於我國、臺灣、交趾支那、斐律賓、巽他島、印度。

— 號 上 冊 圖 故 見 —



1



4



2



3



5




6



7

—昆蟲圖譜上冊—



1. 松玉蟲（亦稱杉玉蟲）*Chalcophora japonica* Gory. 吉丁蟲科

體黑色，有銅色光澤。產於我國、日本、臺灣、印度。

2. 擬鍬形蟲 *Triclenotoma davidi* Deyrolle. VAR. *formosana* Kriesche. 擬鍬形蟲科

體形頗大，褐黃色。產於我國、臺灣，甚稀。

3, 4. 深山鍬形蟲（3, 雄；4, 雌）*Lucanus maculifemoratus* Motschulsky. 鍬形蟲科

體形大小隨個體而變異，濃褐色。頭大，前角有耳狀突起。雄者大顎甚粗，末端分叉，內側具4齒。翅鞘暗紫紅色。產於我國北部及日本。

5. 齒鍬形蟲（雄）*Eurytrachelus platymelus* Saunders. 鍬形蟲科

體形較小，黑色，有光澤。大顎基部附近有大齒。產於我國、日本、朝鮮。

6. 小青花潛 *Oxycetonia jucunda* Faldermann. 金龜子科  
體綠色，有光澤。翅鞘有對稱之淡褐色斑，大小不等。分布於我國、日本、美國。

7. 黑花潛 *Grycyphana fulvistemma* Motschulsky. 金龜子科  
體黑色，翅鞘有淡黃色斑紋。產於我國、日本。

—昆蟲圖譜上冊—

1. 白星花潛 *Liocola brevitarsis* Lewie. 金龜子科

體黑銅色，有光澤。翅鞘有白斑。產於我國、日本、西伯利亞、臺灣。

2. 赤斑金龜子 *Anthracophora rusticola* Burmeister. 金龜子科

體形較小，體色黃褐，略帶赤色，翅鞘有不規則小斑紋。產於我國、日本。

3. 朝鮮角金龜子 *Dicranoccephalus adamsi* Pascoe. 金龜子科

體黑色，前背板及翅鞘有灰色粉狀物。產於我國、朝鮮。

4. 金蟬 *Rhomborrhina japonica* Hope. 金龜子科

體赤銅色，棲於櫟樹上。我國、日本、朝鮮均有分布。

5, 6. 角蟬 (5, 雄; 6, 雌) *Phileurus chinensis* Faldermann 金龜子科

體黑，頭部有短角 1，棲於朽木間。產於我國、日本、臺灣、緬甸。


7. 獨角仙 (又名兜蟲) (雄) *Xylotrupes dichotomus* Linné. 金龜子科

普通體黑褐色，翅鞘稍淡。雌者無角狀突起。吸食櫟樹液汁。分布於我國、日本、斐律賓、印度。

8. 臺灣兜蟲 (雄) *Oryctes rhinoceros* Linné. 金龜子科

體黑褐色，略有光澤。角狀突起頗短小。為甘蔗之害蟲。產於我國、臺灣。

— 昆蟲圖譜 上冊 —




—昆蟲圖譜上冊—




1




2



3



4



5



6



7



8



9

—昆蟲圖譜上冊—

1 黑金龜蟲 *Holotrichia kiotoensis* Blenske. 金龜子科

體黑色，有光澤。幼蟲食害蘋、櫻、梨等之根。分布於我國、日本、臺灣。

2. 粉蠍（雌）*Melolontha frater* Arrow. 金龜子科

體褐色，背部有白毛，爲杉樹之害蟲。產於我國及日本。

3. 臺灣青銅鉢 *Anomala expansa* Bates. 金龜子科

體綠色，有光澤。爲果樹之著名害蟲。分布於我國、臺灣。

4. 黑圓金龜子（雄）*Onthophagus ater* Waterhouse. 金龜子科

體黑色，有光澤。棲息於獸糞間，極普通。產於我國、日本等處。

5, 6. 大黑金龜子（5, 雄；6, 雌）*Copris ochus* Motschulsky. 金龜子科


體呈卵形。黑色有光澤。頭部扁平呈扇面狀，雄者中央有角狀突起，前端銳利，曲向後方。產於我國、日本、朝鮮、臺灣。

7, 8, 9. 臺灣大黑金龜子（7, 雄；8, 雌；9, 矮小型，雄）*Catharsius molossus* Linné 金龜子科

體呈卵形，背面隆起甚高。全體黑色有光澤。雄者前頭有角狀突起。棲息水牛糞中。產於我國、印度、爪哇、錫蘭、臺灣等處。

1. 黑扁金龜子 *Gymnopleurus sinuatus* Olivier. 金龜子科  
體呈橢圓形，黑色有光澤，觸角之片狀部淡黃褐色。喜食牛糞。分布於我國、臺灣、印度、巽他島。
2. 木蠹 *Glischrochilus japonicus* Motschulsky. 出尾蟲科  
體黑色，有光澤。翅鞘斑紋赤色。雄者大顎發達。產於我國。
3. 大木蠹 *Helota gemmata* Gorham. 大木蠹科  
體黑褐色，翅鞘有黃色斑點4個。產於我國、日本等處。
4. 青鑿 *Necrobia violacea* Linné. 郭公蟲科  
體黑藍色。為動物標本著名之害蟲。分布徧世界。
5. 郭公蟲 *Necrobia ruficollis* Fabricius. 郭公蟲科  
體暗綠色，前胸背及翅鞘之1部分赤褐色。食害動物性標本。分布徧世界。
6. 圓背標本蟲 *Gibbium psyllioides* Czempinski. 標本蟲科  
體褐色有光澤。翅鞘作球形隆起，左右駢連，後翅缺。在昆蟲標本或廁所中常有其蹤跡。
7. 標本蟲 *Ptinus fur* Linné. 標本蟲科  
體黃褐色，害食標本及毛皮等物。分布徧世界。

—昆蟲圖譜上冊—




1



2




3



4



5



6

7

—昆蟲圖譜上冊—



1



2




3



4



5



6



7

1. 四星前紋埋葬蟲 *Necrophorus quadripunctatus* Kraatz.

埋葬蟲科

體黑色，有光澤。翅鞘橙黃色，小楯板2側及中央有黑色波狀橫帶，肩部及翅端附近各有黑色小圓斑。產於我國、日本。

2. 小黑埋葬蟲 *Ptomascopus morio* Kraatz. 埋葬蟲科

體黑色有光澤。翅鞘短，腹部外露。產於我國、日本等處。

3. 前紋埋葬蟲 *Nicrophorus maculifrons* Kraatz. 埋葬蟲科

體黑色，翅鞘有橙黃色波斑紋。產於我國、日本等處。

4, 5. 埋葬蟲 (4, 雄; 5, 雌) *Nicrophorus japonicus* Harold.

埋葬蟲科

體黑色。觸角呈球桿狀。翅鞘黑色，有橙黃色橫帶。本種及以上3種均極喜食動物屍體。產於我國、日本、西伯利亞。

6. 閻魔蟲 *Hister jekeli* Marseul. 閻魔蟲科

體黑色，有光澤。頭胸部頗似閻王之冠，故名。喜食鳥獸屍體。分布於我國、日本、朝鮮、臺灣。

5. 中國大閻魔蟲 *Pachylister chinensis* Quenstedt. 閻魔蟲科

體形較上種稍大，頭部略長。體色較黑，產於我國及臺灣。

一 墓 土 風 滅 痘

— 102 —

符水

蛇色黑青中央赤紅。頭圓小，身黃並青斑。兩後角，心黑帶  
。本日，開井氣氣。近聞心色黑青谷深側齒又暗黑，帶側  
輪齒裏。 — 103 —

符水

。讀書本日，風氣微涼。蛇頭蛇色黃白有青斑，色黑帶  
。 — 104 —

符水


火燭本。符頭蛇黃白赤，身黑帶白。頭側無黑斑。色黑帶  
。 — 105 —


符水


。讀書本日，風氣微涼。符頭蛇頭金黃色，身黑帶  
。 — 106 —

符水

。讀書本日蛇赤赤，頭青色帶。身青白赤，大頭鐵土燒紙燈














NO. 072