

中學生自然研究叢書

植 物 圖 譜

下 冊

沐紹良編譯

王雲五 周建人 主編

商務印書館發行







中學生自然研究叢書

植 物 圖 譜

下 冊

沐紹良編譯

王雲五 周建人 主編

商 務 印 書 館 發 行

中華書局影印

蘇 軾 詩 集

卷 一

蘇軾詩集

王 正 真 撰 主 蘇

商務印書館

植物圖譜

下冊目次

1. 黃堇 2. 紫堇 3. 野胡椒草 4. 蔞菜116
1. 豆瓣菜 2. 小水田芥 3. 薺 4. 野南芥菜119
1. 昨葉何草 2. 景天 3. 虎耳草 4. 紅梅消120
1. 潑盤 2. 懸鈎子 3. 野薔薇 4. 小蛇莓123
1. 櫻 2. 李之一種 3. *Pyracantha angustifolia*
Schneid. 4. 蛇莓124
1. 棣棠花 2. 山楂 3. 榲桲 4. 榎榲127
1. 枇杷128
1. 牻牛兒苗131
1. 紫雲英 2. 合歡 3. 南合歡 4. 土圜兒132
1. 野百合 2. 紫荊 3. 小槐花 4. 胡枝子135
1. 木本胡枝子 2. 貓荻 3. 蒔繪荻 4. 野豌豆136
1. 苜蓿 2. 小苜蓿 3. 天藍 4. 香草木樨139
1. 鹿藿 2. 刺槐 3. 槐 4. 白苜蓿140

1. 歪頭菜 2. 烏喙豆 3. 箭筈豌豆 4. 馬鐵酢漿草 143
1. 酢漿草 2. 蒺藜 3. 狗橘 4. 常山144
1. 吳茱萸 2. 金橘 3. 澤漆 4. 地錦草147
1. 烏桕 2. 蓖麻 3. 葉下珠 4. 罌子桐148
1. 罌子桐之一種 2. 黃楊 3. 漆樹 4. 臭毛漆樹 ...151
1. 鹽膚木 2. 南蛇藤 3. 正木 4. 三角楓152
1. 槭樹 2. 七葉樹 3. 龍眼 4. 欒樹155
1. 勾兒茶 2. 貓乳 3. 蓼莪 4. 烏蘇莓156
1. 蛇葡萄 2. 茶 3. 枹 4. 深山木天蓼159
1. 地耳草 2. 毛堇菜 3. 中國紫花地丁 4. 紫花地
丁.....160
1. 犁頭草 2. 秋海棠 3. 三日黃子 4. 胡頹子163
1. 四角菱 2. 二角菱 3. 丁香蓼 4. 竊衣164
1. 水芹 2. 前胡 3. 澤芹 4. 芹葉鉤吻167
1. 北柴胡.....168
1. 山茱萸.....171
1. 四照花 2. 苞越橘 3. 黃石南 4. 紫金牛172
1. 君遷子 2. 小茄 3. 星宿菜 4. 珍珠菜175
1. 櫻草.....176

1. 連翹.....179
1. 銀桂 2. 金桂 3. 深碧連翹 4. 女貞180
1. 石龍膽 2. 小旋花 3. 濱旋花 4. 附地菜183
1. 紫丹 2. 梓木草 3. 馬鞭草 4. 牡荊184
1. 海州常山 2. 金瘡小草 3. 雪風草 4. 鼠尾草187
1. 連錢草 2. 芫蔚 3. 鑿菜 4. 薺萼188
1. 荏 2. 薄荷 3. 佛座 4. 伏地筋骨草191
1. 黃芩.....192
1. 枸杞.....195
1. 龍葵 2. 苦蕒 3. 波斯水苦蕒 4. 陌上番椒196
1. 婆婆納 2. 狼尾拉花 3. 陰行草 4. 彈刀子菜199
1. 通泉草 2. 楸 3. 胡麻 4. 野菰200
1. 耳挖草 2. 爵牀 3. 車前 4. 二葉葎203
1. 四葉葎 2. 牛皮凍 3. 猪殃殃 4. 蝴蝶樹204
1. 野苣 2. 胭脂麻 3. 印度馬陵 4. 半邊蓮207
1. 沙參.....208
1. 蒲公英.....211
1. 小蒸草 2. 東風菜 3. 女苑 4. 阿爾泰紫苑212
1. 艾蒿 2. 黃花蒿 3. 茵陳蒿 4. 牡蒿215

—植物圖譜下冊—

1. 狼把草 2. 雞兒腸 3. 野菊 4. 黃鵪菜216
1. 烟管頭草 2. 山蘭 3. 鱧腸 4. 秋鼠麴219
1. 一年蓬 2. 山萵苣 3. 剪刀股 4. 續斷220
1. 苦菜 2. 一枝黃花 3. 狗舌草 4. 藁耳223

1. 黃堇 *Corydalis pallida* Pers. 罂粟科

山中向陽傾斜地之越年生草，頗軟弱，稍帶肉質。越冬後，自根株簇生根葉及根莖，莖梢綴以花序。花黃色。

2. 紫堇 *Corydalis incisa* Pers. 罂粟科

疎林中之多年生草，草質軟弱，無毛平滑，略被粉末。四五月間，苗生根葉及莖，於莖上部綴花序。花淡紫色，有黑紫色斑點。

3. 野胡椒草 *Lepidium virginicum* Linn. 英名 Wild Peppergrass. 十字花科

枝幹多葉，開緊密之總狀花，結圓形蒴果。花極小，在花序頂端，花瓣白色，內有雄蕊 2 個。葉之生於上部者，邊緣略有鋸齒，作波紋狀，中部者作橢圓形，有粗鋸齒，下部者除鋸齒外，作部分之羽狀分裂。花期自六月至九月。此種野草分布殆徧世界，凡道旁及荒地中均有其踪跡。性堅強，即在乾燥之土堆上或受烈日曝曬，亦能生存。

4. 蔊菜 *Nasturtium montanum* Wall. 十字花科

多枝平滑之野草。開十字形黃色小花。上部之葉無柄，狹橢圓形，具波狀刻齒；下部之葉有葉柄，葉片之底部作羽狀分裂。莢果細長，略形彎曲。本種在荒地中多有繁殖，頗強韌。秋日開花。其基部之葉有時可長至 15 厘米。



1



2



3



4



1



2



3



4

1. 豆瓣菜 *Nasturtium officinale* R. Br. 十字花科

池沼溝瀆等處之蔓性多年生草，出匍枝以繁殖。葉莖滑澤，略帶赤色。初夏，出梗莖，綴白花。原產地據云在歐洲，今我國亦有繁殖。味淡而辛，可食。

2. 小水田芥 *Cardamine lyrata* Bunge. 十字花科

產於澤畔，為多年生草。全株帶紫綠色，軟弱，無毛，滑澤。自根際延伸匍枝，上生根莖。葉卵形，邊緣波狀。初夏，於莖梢開小白花，花後結角果，短而粗。

3. 齋 *Capsella Bursa-pastoris* Medic. 英名 Shepherd's purse. 十字花科

為普通之1年生植物，略有毛茸。根直長；由多數白色小花集成總狀花序；果實扁平，三角形；莖葉無柄，其形如箭；底部之葉有波狀刻齒或作羽狀分裂。分布甚廣，凡溫帶各地，均有其踪跡。早春開花，花期甚長，直至晚秋。

4. 野南芥菜 *Arabis hirsuta* Scop. 十字花科

生於原野之越年生草。莖直豎；全株被短毛。根生之葉呈長橢圓形，有刻齒；上部之葉無葉柄，抱莖而生。初夏，於莖頂開白色小花，形成穗狀花序。果實細長，沿莖直立。

1. 昨葉何草 *Cotyledon japonica* Maxim. 景天科

生於山地之草本植物，亦生於石上或屋上。葉多肉質，先端尖細，多數相重疊。夏季，葉心抽莖，高約 4—5 寸，開花。花序成長穗狀，花小，帶淡白色。亦作觀賞植物栽培。

2. 景天 *Sedum alboroseum* Bak. 景天科

栽培於庭園中之觀賞植物，亦可瓶插。多年生草。莖直立，無毛，自根株簇生，不分枝。葉多漿汁，淡綠色，無毛，平滑，被白粉，性耐旱。初秋，於莖頂開密集之淡紅色小花。

3. 虎耳草 *Saxifraga sarmentosa* Linn. 虎耳草科

本種野生於山間濕潤之岩壁上，可移植於庭園陰地，以供觀賞。多年生草。葉有長柄，自根株簇生，稍厚，表面暗綠色，有白斑，被粗毛，裏面紅色，滑澤。根株之側方出長匍枝以繁殖。初夏抽梗莖，開白色不整齊之 5 瓣花。

4. 紅梅消 *Rubus triphyllus* Thunb. 薔薇科

原野、丘麓等向陽傾斜地之匍匐性落葉小灌木。出匍莖及直立莖，均密生短毛，散生鈎棘。葉 3 出，裏面粉白色。初夏，於每 1 枝頭開花數朵，花瓣紫紅色，並不完全開放。果實於盛夏成熟，呈濃紅色。果粒粗，可食。




1




2



3



4



1



2



3



4

1. 潑盤 *Rubus Thunbergii* Sieb. et Zucc. 薔薇科

疎林中之小灌木。有短匍枝，全體密布褐色短腺毛，且散生棘針。葉被短毛。初夏，於新枝之頂開白色單性花。

2. 懸鈎子 *Rubus incisus* Thunb. 薔薇科

山野荒地及疎林等處之落葉灌木。新莖被白粉，葉片支脈顯著，裏面粉白色。莖、葉柄均有銳利之短棘。晚春，於短枝上開白色花。果實成熟呈血紅色，可食。

3. 野薔薇 *Rosa multiflora* Thunb. 薔薇科

原野之落葉灌木。枝幹細而分歧，略有蔓性。莖平滑，綠色，散生鈎棘。葉無毛，平滑，光澤。初夏，開5瓣之白花，有芳香。果實爲小球粒，晚秋成熟，呈赤色。

4. 小蛇莓 *Potentilla centigrana* Maxim. 薔薇科

丘麓濕地等處之匍匐性多年生小草。葉薄，無毛，平滑，表面青綠色，裏面淡綠色。晚春，於節腋出小花梗，開淡黃色5瓣之花。

1. 櫻 *Prunus pseudo-Cerasus* Lindl. 薔薇科

落葉木本。早春，先葉開花，作繖形花序。花梗有纖毛。花瓣5片，瓣端淺裂，淡紅色，雄蕊甚多，雌蕊1枚。葉卵形，有尖端，邊緣有刻齒。果實如核果，紫赤色，核小，味甘。本種之花供觀賞；果供食用；木材緻密而堅，可製器物。

2. 李之一種 *Prunus triflora* Roxb. 薔薇科

落葉果樹。春季，先葉開花，花白色，花梗、萼、葉均無毛；果實球形，果梗長，果皮滑澤，成熟呈赤色。

3. *Pyracantha angustifolia* Schneid. 薔薇科


庭園籬落間之常綠小木本。枝幹細密，短枝呈棘狀。葉長橢圓形，革質，被短毛，如敷白粉。夏秋之交，開白色小花。果實黃赤色，扁球形。

4. 蛇莓 *Duchesnea indica* Focke. 薔薇科


原野畦畔向陽地帶之多年生草，匍匐性，匍莖之節生根，以此繁殖。葉、莖均被粗短毛。晚春，自葉腋生長花梗，開黃色花。花後結偽果，即於多肉之花托上，散布微細赤色之瘡果。



1



2



3



4



1



2



3



4

1. 棣棠花 *Kerria japonica* DC. 薔薇科

落葉灌木。莖自根株簇生，老莖略形斜垂。晚春，於新芽頂端開花，花鮮黃色，甚美，以後改呈黑褐色，結小果5粒。本種野生於山間傾斜地及溪崖等處，亦有用人工栽培於庭園內以供觀賞者，除單瓣花外，又有重瓣品種。

2. 山楂 *Crataegus cuneata* Sieb. et Zucc. 薔薇科

落葉木本。枝幹多分歧；葉無毛，滑澤。初夏，開白色5瓣繖形花。果實球形，頂端有5萼片，成熟後呈赤色。

3. 榲桲 *Cydonia vulgaris* Pers. 薔薇科

落葉木本。葉全緣，表面被微毛，裏面密布綿毛。初夏，於新枝之頂開花，花色淡紅。果實呈梨子形，外皮甚薄，被毛，晚秋成熟，呈黃綠色，酸味頗強。


4. 榲桲 *Cydonia sinensis* Thouin. 薔薇科

落葉木本植物。葉緣有細刻齒，裏面被微毛。晚春，於短梗開淡紅色之花。果實形如梨子，外皮無毛，平滑，晚秋成熟，香氣甚佳，酸味甚強。

枇杷 *Eriobotrya japonica* Lindl. 薔薇科

暖地果樹之1種。常綠喬木。葉厚，長大，表面濃綠色，平滑，裏面被絨毛，幼莖及葉柄均密布黑色毛茸。晚秋，於梢頭出花序，開密布褐色毛茸之花。花乳白色，有芳香。果實至翌年初夏黃熟，味甘而酸，可食。





牻牛兒苗 *Geranium nepalense* Sweet. 牻牛兒科

原野之多年生草。莖自根際分生，貼近地面，與葉均被毛茸。夏秋之交，於枝頭分梗開花。果實成熟後，心皮開裂反捲，將種子彈出。為有名藥用植物之1。(圖上左為根生葉，上右為紅花品種，下方為白色品種。)

1. 紫雲英 (俗稱草子) *Astragalus sinicus* Linn. 英名
Chinese Milk Vetch 豆科

草本植物。莖蔓延地上，於頂端開花，作繖狀花序，爲蝶形之紫紅色小花 (亦有白花者)。葉爲奇羽狀複葉，下有托葉，小葉卵形至圓形。花謝後結莢，呈黑色。

2. 合歡 *Albizia Julibrissin* Durazz. 豆科

生於山間，爲落葉喬木。葉爲重羽狀複葉，無毛，合多數小葉而成。小葉於夜間閉合，呈睡眠現象。盛夏，於梢頭開花，花瓣退化，雄蕊多而長，呈毛狀，紅色。果實爲扁平之莢，至秋成熟。木材堅硬，可製器物。葉可煎之以洗濯衣服。全株供觀賞。

3. 南合歡 *Albizia Lebbek* Benth. 豆科


熱帶性喬木。葉爲重羽狀複葉，小葉質薄，淡綠色。花淡黃色；果實爲扁平之莢，頗長。

4. 土團兒 *Apios Fortunei* Maxim. 豆科


多年生蔓性草本，原野間偶見之。蔓甚長，生羽狀複葉，每葉由 5 小葉合成，薄而平滑。盛夏，葉腋間下垂總狀花序，開淡黃色小花。根莖塊狀，可供食用，亦可製小粉。



1



2



3



4



1



2



3



4

1. 野百合 *Crotalaria sessiliflora* Linn. 豆科

原野偶見之1年生草。莖直立，枝幹分歧甚少。葉單一，與莖均被如絹之軟毛。盛夏，於莖頂開穗狀花，萼較大，毛茸甚多，花瓣紫色。花後結橢圓形莢果。

2. 紫荊 *Cercis chinensis* Bunge. 英名 Judas bush. 豆科

落葉小木本。葉略似心臟形，有光澤，互生。春季，先葉於腋節簇生紫色小花，蝶形花冠。果實為薄質扁平之莢，下垂。原產地在我國，供觀賞。多以人工栽植。

3. 小槐花 *Desmodium laburnifolium* DC. 豆科

暖地疎林中之小灌木，直立，上部分歧。葉3出，嫩葉被短毛，老葉無毛。濃綠，革質。盛夏，於莖頂及葉腋間出細穗，上綴淡黃色小花，結節莢。

4. 胡枝子 *Lespedeza bicolor* Turcz. 豆科

山野之灌木性多年生草，分枝頗多，枝條細而硬，略形斜垂。葉無毛，平滑。初秋，於莖頭分生小梗，上綴淡紫紅色小花，頗悅目。

1. 木本胡枝子 *Lespedeza Buergeri* Miq. 豆科

生於疎林中之灌木。枝幹瘠細，略斜垂；葉薄而滑，邊緣有波狀刻齒。夏秋之交，自葉腋出花穗，花淡黃色，有紫色暈，並不甚美。

2. 貓荻 *Lespedeza pilosa* Sieb. et Zucc. 豆科

原野向陽傾斜地之多年生草。莖具蔓性，偃臥。全枝被軟毛。盛夏，於葉腋開白色小花。結短莢。

3. 蒔繪荻 *Lespedeza virgata* DC. 豆科

原野纖細之多年生草。莖、葉均無毛。盛夏時，於葉腋出細花梗，開白色小花。結短莢。

4. 野豌豆 *Lathyrus maritimus* Bigel. 豆科

海濱砂地等處之多年生蔓草。全株平滑，被白粉。初夏，於葉腋出花梗，開美麗之紫色花。果實如豌豆而較小。





1



2



3



4

1. 苜蓿 (又名金花菜) *Medicago denticulata* Willd.

豆科

自生於曠野中，1年生草。莖分歧，偃伏，與葉均不被毛，鮮綠色。初夏，自葉腋出細花梗，開黃色小花。果實屈曲呈螺旋狀，於其上列生短棘毛。可供食用。

2. 小苜蓿 *Medicago minima* Linn. 豆科

1年生草，形與普通之苜蓿酷似，但較矮小。葉、莖有微毛；花細；果實被棘毛甚多。

3. 天藍(又名野苜蓿) *Medicago lupulina* Linn. 豆科

越年生草。莖軟，在地面分歧偃伏，略被軟毛。葉鮮綠色，光滑。初夏，自葉腋出細花梗，開螺旋狀小黃花。果實如米粒，成熟呈黑色，無棘毛。

4. 香草木樨 *Melilotus officinalis* Lam. 英名 Sweet Clover, Yellow Melilot. 豆科

高而直上之草本植物，有芳香。葉分裂為3小葉；開黃色小花，總狀花序。莢果卵形，有皺紋，內有種子1顆，稀有開裂者。本種為廣布各地之1年生草，凡新舊大陸之已開墾未開墾土地，均有繁殖。乾燥時，香氣尤為濃郁。

1. 鹿藿 *Rhynchosia volubilis* Lour. 豆科

原野之多年生蔓草。蔓長數尺；葉、莖均密被粗毛。盛夏，自葉腋出細梗，開黃色小花。莢短，內藏種子2個，晚秋老熟，呈暗赤色；種子有光澤，呈漆黑色。

2. 刺槐 *Robinia pseudacacia* Linn. 豆科

落葉喬木。葉爲羽狀複葉，無毛，平滑；托葉爲棘1對。初夏，自葉腋出穗狀花序，開白花。原產地在北美。今我國亦有栽植。

3. 槐 *Sophora japonica* Linn. 豆科

庭園、街路等處之落葉喬木。葉無毛，平滑。盛夏，於梢頭開銹黃色花。果實呈連球狀，有縊，多肉質；種子黑色。

4. 白苜蓿 *Trifolium repens* Linn. 英名 White Clover 豆科

低矮之草本植物。根莖爬行地面，極易蔓延。莖光滑而細；葉分爲3小葉。小葉緣有細刻齒，前端凹入，葉面有帶狀斑紋。花莖甚長，上綴頭狀花序，由多數白色蝶形小花組成；至成熟時頗見疎鬆。本種在我國及美國東部均極普遍。潮濕之土地，繁殖最速。



1



2




3



4



1



2



3



4

1. 歪頭菜 *Vicia unijuga* Al. Br. 豆科

山野疎林間之多年生草，尤以傾斜地帶繁殖最多。莖瘠細，稍硬，分枝斜上，與葉均光滑。夏秋之交，於葉腋出小梗，開美麗之紫紅色花。

2. 烏喙豆 *Vicia tetrasperma* Maench. 豆科

原野越年性蔓草。全株細纖，無毛平滑。葉爲羽狀複葉，其前端有卷鬚。春夏之交，自葉腋出細梗，開紫色小花。莢果滑澤，每梗1個，間有結2莢者。每莢內藏種子4個。

3. 箭筈豌豆 *Vicia sativa* Linn. 豆科

原野之越年生蔓草。蔓與葉均光滑。羽狀複葉之前端有卷鬚。晚春，於葉腋出短梗，開紫紅色之花。花謝後結莢。

4. 馬鐵酢漿草 *Oxalis Martiana* Zucc. 酢漿草科

草本植物，無莖，惟地下有複合之塊狀莖。葉根生，由3小葉複合而成，徑約6厘米。小葉頗大，前端凹入。葉柄長21厘米，下部多毛。花梗亦爲根生，全體被毛，較葉柄略長，末端着生聚繖花序，上開淡紫紅色之花。本種甚普通，常繁殖於草地四周。

1. 酢漿草 (俗稱鹹酸草) *Oxalis corniculata* Linn. 英名 Lady's Sorrel. 酢漿草科

偃臥之多年生草本，多枝。葉交互而生，葉片分爲3小葉，上被毛茸。小葉呈倒心臟形。自葉腋抽出花莖，於其上開黃色小花。結蒴果，成熟後裂開，能彈出細小種子。本種在道旁荒地多有繁殖。花與葉均較馬鐵酢漿草小。在暴露之地面上，此葉恆轉呈銹褐色。葉有酸味。

2. 蒺藜 *Tribulus terrestris* Linn. 蒺藜科

暖地海濱砂土之1年生草。莖自根際分枝，於地面擴展匍走，與葉軸均密生粗毛。葉面平滑，鮮綠。盛夏，開黃色5瓣小花。果實有銳棘5對。

3. 狗橘 *Pseudaegle trifolia* Makino. 芸香科


栽植於邸宅籬落間之落葉木本。棘針長大。初夏，於棘腋開白花；花謝後出葉。葉爲3出複葉，無毛，平滑，有光澤。果實如柑而小，皮堅，晚秋成熟，呈黃色。酸味甚強，不堪食。原產地在我國，今日本亦有繁殖。

4. 常山 *Orixa japonica* Thunb. 芸香科

山間雜生之落葉木本。春季生嫩葉，同時開花。花小，淡綠色，雌雄異株。花謝後，結短小如豆之果實，至秋成熟開裂，散落白色種子。葉薄，無毛，稍滑澤，有不快之氣息。



1



2



3



4




1



2



3



4

1. 吳茱萸 *Evodia rutaecarpa* Hook. et Thoms. 芸香科

落葉木本，枝幹粗而多歧，生大形羽狀複葉，與莖葉均被短毛。初夏，於莖頂密集淡黃色小花。果實扁球形，成熟後，呈污赤色。供藥用。

2. 金橘 (右) *Fortunella japonica* Swingle. (左) *F. Margarita* Swingle. 芸香科

常綠小木本。葉革質，濃綠色，滑澤。初夏開白花，晚秋果實成熟，呈黃色，酸味頗強，供食用。兩種除果形外，其餘均無不同。

3. 澤漆 *Euphorbia helioscopia* Linn. 英名 Sun Spurge Wartweed 大戟科

多汁之1年生草本植物。莖向上，略帶紅色，有乳狀液汁，莖葉互生，壓舌片形，至葉柄漸狹。莖端繖形，5出，每枝又分3叉，枝短。花葉闊壓舌片形，多刻齒。花無花瓣，裹以花萼狀之總苞。在中間者為簡單之雌花，周圍乃雄花，各有雄蕊1個。雌花中3室之子房及3裂之花柱均突出於總苞之外，懸於一旁。據云有刺激性之毒素。花有向日性。

4. 地錦草 *Euphorbia humifusa* Willd. 大戟科

道旁荒地等處低矮之1年生草。莖自根際茁生，內含乳狀白汁，分枝頗多，貼近地面而開展。葉薄，對生，被淡紫色微毛，有黑斑。盛夏，於葉腋開奇形之花。

1. 烏柏 *Sapium sebiferum* Roxb. 大戟科

暖地之落葉喬木。枝幹瘠細，葉薄，無毛，平滑，至秋轉呈紅色，葉柄細。初夏，於梢頭綴小形穗狀雄花，另有雌花 2—3 朵，開於下方。果實球形，開裂後，散落白色種子。

2. 蓖麻 *Ricinus communis* Linn. 大戟科

1 年生草。莖直立，中空，分枝少，平滑，被白粉。葉大，有長柄，無毛，薄而軟，支脈顯著。盛夏，於莖頂開雌花及雄花。果實軟，列棘毛，內藏種子 3 個。種子形如甲蟲，稱為蓖麻子，可榨油。原產地據云在非洲，今我國亦有栽植，為藥用植物之 1 種。

3. 葉下珠 *Phyllanthus Urinaria* Linn. 大戟科

道旁、畦畔等處偶見之小草。莖直立，質軟；葉薄而軟，排列整齊，頗如羽狀複葉。全株無毛。花小，開於葉腋，下方為雌花，上方則係雄花。果實之表面密布疣粒。

4. 罌子桐 (又稱桐油樹) *Aleurites Fordii* Hemsl. 大戟科

產於暖地之喬木。葉薄，有長柄。初夏開花，花小，白色，形成聚繖花序。果實呈尖球形，表面平滑，老熟後裂開，內有種子頗大，可榨油。原產地在我國。



1



2



3



4